

## 平成16年度「薬と健康の週間」 における全国統一事業の結果について（速報値）

平成17年4月  
（社）日本薬剤師会

### （1）薬局・薬店における事業（一般用医薬品販売時の“薬剤師の相談業務”に関するデータ及び相談事例の収集）結果の概要

	平成16年度	平成15年度
参加薬局・薬店数	7,563	7,297
1日あたりの一般薬購入者数	145,989	135,555
一般薬購入者数のうち相談・質問者の数	40,571	39,940
全国の薬局・薬店での1日の購入者数 （推定値）	119万7千人	113万人
そのうち、一般薬を購入し、相談・質問 を行った人数（推定値）	33万1千人	33万人

（注）薬店は「一般販売業」のみ。以下同じ。

### （2）一般用医薬品に関する相談・質問の内容別内訳（複数回答）

	平成16年度	平成15年度
医薬品の選択	27,554(41.0%)	29,618(44.8%)
効能・効果、有効性	8,255(12.3%)	9,250(14.0%)
用法・用量について	6,549(9.8%)	7,908(12.0%)
相互作用について	5,275(7.9%)	3,735(5.7%)
副作用について	3,390(5.0%)	3,775(5.7%)
漢方薬について	3,185(4.7%)	3,146(4.8%)
使用上の注意	2,924(4.4%)	3,705(5.6%)
剤型について	2,882(4.3%)	-
高齢者の服用	1,706(2.5%)	1,530(2.3%)
乳幼児・小児の服用	1,687(2.5%)	-
妊婦・授乳婦の服用	947(1.4%)	891(1.3%)
有効期間について	922(1.4%)	978(1.5%)
たばこ・禁煙	784(1.2%)	-
その他	1,097(1.6%)	1,533(2.3%)
延べ件数 計	67,157(100.0%)	66,069(100.0%)

（注）表中の[-]は平成16年度より新たに追加した項目

(3) 副作用の相談のあった一般用医薬品の「薬効分類別」件数

(件)

平成16年度		平成15年度	
風邪薬	169	精神神経用薬(風邪薬、 解熱鎮痛薬等)	412
解熱鎮痛剤	132		
鎮静剤	34		
その他の精神神経用薬	19		
小計	354		
外用鎮痛・消炎薬	97	外皮用薬	173
その他の外皮用薬	46		
水虫・たむし用薬	38		
その他の感覚器官用薬	8		
発毛・養毛薬	6		
小計	195		
内服アレルギー用薬	34	アレルギー用薬	109
H2ブロッカー	32	消化器官用薬	86
その他の消化器官用薬	17		
その他の胃腸薬	14		
整腸薬、止しゃ薬	7		
胃腸鎮痛痙薬	3		
小計	73		
滋養強壮保健薬	24	滋養強壮保健薬	66
循環器用薬	19	循環器・血液用薬	63
漢方薬	34	漢方製剤	61
鎮咳去たん薬	58	呼吸器官用薬	51
耳鼻科用薬	42	耳鼻科用薬	36
眼科用薬	18	眼科用薬	28
生薬製剤	4	生薬製剤	19
泌尿生殖器官及び肛門用薬	7	泌尿生殖器官及び肛門用	16
歯科口腔用薬	7	歯科口腔用薬	7
うがい薬	1		
小計	8		
女性用薬	2	女性用薬	5
その他	84	その他	84
禁煙補助剤	6		
公衆衛生用薬	1		
一般用検査薬	0		
小計	91		
延べ件数	計 963		1,216

(注) 副作用の報告のあった相談事例のうち、対象薬剤の薬効別分類が判明したもの

#### (4) 副作用の主な症状

(件)

	平成16年度	平成15年度
発疹	137	213
そう痒	96	116
便秘	66	74
眠気	66	143
ほてり・発赤	59	63
口渇	51	88
胃痛	44	86
悪心・嘔吐	34	73
めまい・ふらつき	32	52
食欲不振	27	72
排尿困難	25	37
脱力感	24	38
腹痛	22	39
下痢	20	55
動悸	19	32
むくみ・浮腫	16	34
腹部膨満感	15	23
倦怠感	15	27
口内炎	13	23
膨脹	12	10
ふるえ・振戦	12	16
頭痛	10	25
水疱	8	12
息切れ	8	7
頻脈	6	10
しびれ感	3	8
悪寒	3	12
胸部痛	2	4
発熱	0	6
発汗	0	9
その他	92	193
延べ件数 計	937	1,600

(注) 副作用の報告のあった相談事例のうち、対象薬剤の薬効別分類が判明したもの

## (5) 副作用の相談のあった一般薬の「薬効分類」と主な症状

平成16年度		平成15年度	
風邪薬(169) 解熱鎮痛薬(132) 鎮静薬(19) その他の精神神経用薬(34)  計354	眠気(46)、発疹(45)、胃痛(29)、悪心・嘔吐(20)、便秘(20)、口渇(19)、めまい・ふらつき(19)、そう痒(16)、排尿困難(14)、食欲不振(13)、脱力感(12)、腹痛(11)	精神神経用薬(風邪薬、解熱鎮痛薬等)(412)	眠気(72)、発疹(68)、胃痛(59)、悪心・嘔吐(38)、口渇(33)、食欲不振(32)、めまい・ふらつき(31)、便秘(27)、そう痒(26)、排尿困難(26)
外用鎮痛・消炎剤(97) その他の外用薬(46) 水虫・たむし用薬(38) その他の感覚器官用薬(8) 発毛・養毛薬(6)  計195	そう痒(49)、発疹(45)、ほてり・発赤(40)、眠気(5)	外用薬(173)	発疹(74)、そう痒(58)、発赤(29)
内服アレルギー用薬(34)	眠気(11)、そう痒(4)、口渇(4)、発疹(2)、脱力感(2)	アレルギー用薬(109)	眠気(49)、口渇(23)、発疹(13)
H2ブロッカー(32) その他の消化器官用薬(17) その他の胃腸薬(14) 整腸薬・止しゃ薬(7) 胃腸鎮痛鎮痙薬(3)  計73	下痢(9)、腹痛(8)、発疹(5)、悪心・嘔吐(5)、便秘(4)、口渇(4)、胃痛(3)	消化器官用薬(86)	下痢(20)、腹痛(15)、口渇(12)、便秘(11)、発疹(9)
滋養強壮保健薬(24)	発疹(6)、そう痒(3)、悪心・嘔吐(1)、下痢(1)、便秘(1)、胃痛(1)	滋養強壮保健薬(66)	発疹(13)、食欲不振(8)
循環器用薬(19)	そう痒(3)、発疹(2)、ほてり・発赤(1)、むくみ・浮腫(1)、悪心・嘔吐(1)、下痢(1)、便秘(1)、口渇(1)、めまい・ふらつき(1)	循環器・血液用薬(強心薬等)(63)	発疹(10)、悪心・嘔吐(7)、ほてり(6)、下痢(6)、めまい・ふらつき(6)
漢方薬(34)	むくみ・浮腫(3)、胃痛(3)、頭痛(3)、動悸(3)、ほてり・発赤(2)、腫脹(2)、悪心・嘔吐(2)、食欲不振(2)、脱力感(2)	漢方製剤(61)	浮腫(9)、発疹(7)、食欲不振(7)、胃痛(7)、悪心・嘔吐(6)、下痢(6)
鎮咳去たん薬(58)	便秘(29)、口渇(7)、めまい・ふらつき(4)、発疹(3)、食欲不振(2)、眠気(2)、排尿困難(2)	呼吸器官用薬(鎮咳去たん薬等)(51)	便秘(20)、発疹(6)、食欲不振(6)、悪心・嘔吐(6)
耳鼻科用薬(42)	口渇(10)、眠気(10)、便秘(2)、排尿困難(2)	耳鼻科用薬(36)	眠気(15)、口渇(8)

(注) 副作用の報告のあった相談事例のうち、対象薬剤の薬効別分類が判明したもの

(6) 薬剤師のとした措置(複数回答)

	平成16年度	平成15年度
使用の中止を指示	304(30.1%)	477(27.0%)
服薬指導	227(22.5%)	383(21.7%)
医療機関を紹介	177(17.5%)	153(8.7%)
治療のため他の薬を推奨	110(10.9%)	180(10.2%)
薬効の同じ他の薬を推奨	96(9.5%)	210(11.9%)
減量を指示	30(3.0%)	101(5.7%)
当該メーカーへ連絡、情報提供	19(1.9%)	48(2.7%)
厚生労働省の医薬品・医療用具等安全性情報報告制度へ報告	2(0.2%)	8(0.5%)
その他	44(4.4%)	205(11.6%)
延べ件数 計	1,009(100.0%)	1,765(100.0%)

(注) 副作用の報告のあった相談事例のうち、対象薬剤の薬効別分類が判明したものについて薬剤師のとした措置